

O površini bicentričnog četverokuta

Mandi Orlić Bachler, Zoran Kaliman

Sažetak

U ovom radu pomoću programskog paketa Wolfram Mathematica izveli smo relaciju, u ovisnosti o paramerima R , r i d , za izračun maksimalne i minimalne površine bicentričnog četverokuta. Opisali smo bicentrični četverokut te izložili do sada izvedene relacije za izračun njegove površine.

Ključni pojmovi: bicentrični četverokut, površina, Fussova relacija.

1. Uvod

Još od kraja 18. stoljeća matematičari su pokušavali za bicentrični mnogokut pronaći relaciju koja povezuje polumjere njemu upisane i opisane kružnice, te udaljenosti između njihovih središta. Odgovarajuće relacije za bicentrični četverokut, peterokut, šesterokut i sedmerokut prvi je pronašao Nicolaus Fuss (1755.–1826.), stoga te izraze danas nazivamo Fussove relacije. Odgovarajuću relaciju za trokut izveo je Euler. Taj problem uvršten je i među stotinu najvećih problema elementarne matematike [1]. Do danas su mnogi matematičari, na različite načine izveli Fussove relacije za te, ali i druge mnogokute [2]–[7].

U ovom ćemo se radu baviti izračunom površine bicentričnog četverokuta. Na početku prisjetimo se sljedećih definicija.

Definicija 1. *Konveksni mnogokut je mnogokut koji sadrži spojnicu svakih svojih dviju točaka.*

Definicija 2. *Konveksni mnogokut kojemu se može opisati i upisati kružnica naziva se bicentrični mnogokut.*

Značajan teorem u vezi s bicentričnim mnogokutima iskazao je francuski matematičar Jean Victor Poncelet (1788. – 1826.), a koji glasi:

Teorem 3 (Ponceletov teorem). *Neka su k_1 i k_2 bilo koje dvije kružnice u ravnini tako da je k_2 unutar k_1 . Ako postoji bicentrični mnogokut s upisanom kružnicom k_2 i opisanom kružnicom k_1 tada postoji neizmjereno mnogo bicentričnih mnogokuta kojima je k_2 upisana, a k_1 opisana kružnica. Za svaku točku A_1 na kružnici k_1 postoje točke A_2, \dots, A_n na toj kružnici takve da su A_1, \dots, A_n vrhovi bicentričnog mnogokuta kojemu je k_2 upisana, a k_1 opisana kružnica.*

2. Površina bicentričnog četverokuta

Bicentrični četverokut je konveksni četverokut koji je istovremno tetivni (njegove stranice su tetive njemu opisanoj kružnici) i tangenti (njegove stranice su tangente njemu upisanoj kružnici) te za njega vrijedi Fussova relacija:

$$(R^2 - d^2)^2 = 2r^2 (R^2 + d^2), \quad (1)$$

gdje je R polumjer opisane kružnice, r polumjer upisane kružnice, a d udaljenost između središta opisane i upisane kružnice četverokuta [7]. Za izračun površine bicentričnog četverokuta poznato je nekoliko relacija koje iskazujemo sljedećim teoremima.

Teorem 4. *Površina bicentričnog četverokuta, kojemu je R polumjer opisane, a r polumjer upisane kružnice te θ kut između dijagonala iznosi*

$$P = r \left(r + \sqrt{4R^2 + r^2} \right) \cdot \sin \theta.$$

Korolar 5. *Za površinu bicentričnog četverokuta, kojemu je R polumjer opisane, a r polumjer upisane kružnice vrijedi*


$$P \leq r \left(r + \sqrt{4R^2 + r^2} \right) \quad (2)$$

pri čemu znak jednakosti vrijedi ako i samo ako je četverokut deltoid.

Prisjetimo se definicije deltoida.

Definicija 6. *Četverokut kojemu su po dvije stranice međusobno jednakih duljina, a dijagonale okomite, naziva se deltoid.*

U literaturi [8] dokazani su teorem 4 i korolar 3. Korolar 5 posljedica je teorema 4, dokazuje činjenicu da od neizmjereno mnogo bicentričnih četverokuta, koji se konstruiraju na način opisan u teoremu 3, onaj s



Slika 1. Na slici je prikazan bicentrični četverokut s vrhovima A_1, A_2, A_3, A_4 , gdje je R polumjer opisane kružnice, r polumjer upisane kružnice i d udaljenost između središta upisane i opisane kružnice.

najvećom površinom je upravo bicentrični četverokut koji je deltoid. Bicentrični deltoid dobit ćemo ako za polaznu točku (prema teoremu 3) uzmemo točku s koordinatama $A_1(R, 0)$. Ostali vrhovi tako dobivenog četverokuta tada su $A_2(x_2, y_2)$, $A_3(-R, 0)$, $A_4(x_2, -y_2)$. Znači takav bicentrični četverokut simetričan je s obzirom na x os.

Teorem 7. *Za površinu bicentričnog četverokuta, kojemu je R polumjer opisane, a r polumjer upisane kružnice vrijedi*

$$P \geq 2r \sqrt{2r \left(\sqrt{4R^2 + r^2} - r \right)} \quad (3)$$

pri čemu znak jednakosti vrijedi ako i samo ako je četverokut jednakokračni trapez.

Dokaz teorema 7 nalazi se u [9]. Teorem 7 dokazuje činjenicu da od neizmjerljivo mnogo bicentričnih četverokuta, koji se konstruiraju na način opisan u teoremu 3, onaj s najmanjom površinom je bicentrični jednakokračni trapez. Takav četverokut dobit ćemo ako za polaznu točku uzmemo točku s koordinatama $A_1(r+d, y_1)$. Ostali vrhovi tako dobivenog četverokuta tada su $A_2(x_2, y_2)$, $A_3(-x_2, -y_2)$, $A_4(r+d, -y_1)$.

Teorem 8. *Bicentrični četverokut sa stranicama $a = |A_1A_2|$, $b = |A_2A_3|$, $c = |A_3A_4|$ i $d = |A_1A_4|$ ima površinu*

$$P = \sqrt{a \cdot b \cdot c \cdot d}. \quad (4)$$

Teorem 9. *Bicentrični četverokut u kojem je $e = |T_2A_3| = |A_3T_3|$, $f = |T_3A_4| = |A_4T_4|$, $g = |T_1A_1| = |A_1T_1|$ i $h = |T_1A_2| = |A_2T_2|$ ima površinu*

$$P = \sqrt[4]{e \cdot f \cdot g \cdot h} \cdot (e + f + g + h).$$

Teorem 10. *Bicentrični četverokut kojem je $p = |A_3A_1|$, $q = |A_2A_4|$, $l = |T_1T_3|$ i $k = |T_2T_4|$ ima površinu*

$$P = \frac{k \cdot l \cdot p \cdot q}{k^2 + l^2}.$$

Teoremi 8, 9, 10 dokazani su u [10].

2.1. Maksimalna površina bicentričnog četverokuta u ovisnosti o parametrima R , r i d


U ovom dijelu rada izvest ćemo relaciju za izračun maksimalne površine bicentričnog četverokuta, ako su poznate vrijednosti polumjera njemu upisane i opisane kružnice, te udaljenosti između njihovih središta. U tu svrhu promatrat ćemo bicentrični četverokut koji je ujedno i deltoid, što nam omogućava korolar 5. Bicentrični četverokut koji promatramo prikazan je na slici 2.

Tvrđnja 11. *Bicentrični četverokut, kojemu je R polumjer opisane kružnice, r polumjer upisane kružnice i d udaljenost između njihovih središta te kojemu je jedan vrh $A_1(R, 0)$ ima površinu*

$$P = \frac{4rR^2\sqrt{d^2 - r^2 - 2dR + R^2}}{(d - R)^2}.$$

Dokaz. Neka je zadana kružnica k_2 polumjera r sa središtem u točki $I(d, 0)$ i kružnica k_1 polumjera R sa središtem u ishodištu koordinatnog sustava. Na kružnici k_1 odaberimo točku $A_1(R, 0)$. Zbog simetričnosti točka A_3 ima koordinate $(-R, 0)$. Koordinate točke $A_2(x_2, y_2)$ dobit ćemo kao presjek kružnice k_1 i tangente t_1 povučene iz točke A_1 na kružnicu k_2 . Jednadžbu tangente t_1 dobivamo iz uvjeta da pravac $y = k \cdot x + l$ prolazi točkom A_1 i uvjeta da je taj pravac tangenta kružnice k_2 , odnosno rješavanjem sustav jednadžbi:

$$\begin{aligned} k \cdot R + l &= 0 \\ r^2 \cdot (1 + k^2) - (k \cdot d + l)^2 &= 0. \end{aligned} \quad (5)$$



Slika 2. Na slici je prikazan (deltoid) bicentrični četverokut s maksimalnom površinom.

Slijedi, jednačina tangente t_1 dana je izrazom:

$$y = \frac{r(R-x)}{\sqrt{d^2 - r^2 - 2dR + R^2}}. \quad (6)$$

Rješavanjem sustava:

$$\begin{aligned} y &= \frac{r(R-x)}{\sqrt{d^2 - r^2 - 2dR + R^2}} \\ R^2 &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$

dobivamo koordinate točke $A_2(x_2, y_2)$:

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{R(d^2 - 2r^2 + 2dR + R^2)}{(d+R)^2} \\ y_2 &= \frac{2rR\sqrt{d^2 - r^2 + 2dR + R^2}}{(d+R)^2} \end{aligned}$$

S obzirom da promatramo četverokut simetričan s obzirom na x os koordinate točke $A_4(x_4, y_4)$ su:

$$\begin{aligned} x_4 &= \frac{R(d^2 - 2r^2 + 2dR + R^2)}{(d+R)^2} \\ y_4 &= -\frac{2rR\sqrt{d^2 - r^2 + 2dR + R^2}}{(d+R)^2} \end{aligned}$$

Zbog simetričnosti površina promatranog četverokuta jednaka je dvostrukoj površini trokuta s vrhovima A_1 , A_2 i A_3 . Površina trokuta računa se po izrazu:

$$P_{\Delta A_1 A_2 A_3} = \frac{1}{2} (x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)) . \quad (7)$$

Nakon uvrštavanja koordinata točka A_1 , A_2 i A_3 u izraz (7) dobivamo površinu promatranog bicentričnog četverokuta:

$$P = 2 \cdot P_{\Delta A_1 A_2 A_3} = \frac{4rR^2\sqrt{d^2 - r^2} - 2dR + R^2}{(d - R)^2} . \quad (8)$$

□

Račun za izvod relacije (8) proveli smo pomoću algoritma izrađenog u programskom paketu Wolfram Mathematica.

```
In[1]:= xa1 = R;
        ya1 =  $\sqrt{R^2 - xa1^2}$ ;
        k1 =  $x^2 + y^2 == R^2$ ;

In[4]:= eqta1 = p xa1 + q == ya1;
        eqt =  $r^2(1 + p^2) - (p d + q)^2 == 0$ ;

In[6]:= Solve[{eqta1, eqt}, {p, q}];
        {p, q} /. %;
        rjt4 = %[[1]];
        rjt1 = %%[[2]];

In[10]:= pt4 = rjt4[[1]];
        qt4 = rjt4[[2]];
        pt1 = rjt1[[1]];
        qt1 = rjt1[[2]];

In[14]:= t1a1 = y == pt1 x + qt1;

In[15]:= Solve[{t1a1, k1}, {x, y}];
        {x, y} /. %;
        rja1 = %[[1]];
        rj1a2 = %%[[2]];

In[19]:= xa1 = rja1[[1]];
        ya1 = rja1[[2]];

In[21]:= xa2 = Simplify[rj1a2[[1]]];
        ya2 = Simplify[rj1a2[[2]]];
```

$$\begin{aligned} \text{In[23]}:= & \text{xa3} = -R; \\ & \text{ya3} = 0; \end{aligned}$$

$$\text{In[25]}:= P = \text{Simplify}[\text{xa1}(\text{ya2} - \text{ya3}) + \text{xa2}(\text{ya3} - \text{ya1}) + \text{xa3}(\text{ya1} - \text{ya2})]$$

$$\text{Out[25]}= \frac{4rR^2\sqrt{d^2 - r^2 - 2dR + R^2}}{(d - R)^2}$$

Komentar: Izraz (8) vrijedi samo za onaj bicentrični četverokut koji zadovoljava svojstva deltoida (definicija 6). Za sve ostale bicentrične četverokute možemo jedino tvrditi da je

$$P < \frac{4rR^2\sqrt{d^2 - r^2 - 2dR + R^2}}{(d - R)^2}. \quad (9)$$

Ovu tvrdnju (9) omogućava nam korolar 5.

2.2. Minimalna površina bicentričnog četverokuta u ovisnosti o parametrima R , r i d


U ovom dijelu rada izvest ćemo relaciju za izračun minimalne površine bicentričnog četverokuta, ako su poznate vrijednosti polumjera njemu upisane i opisane kružnice, te udaljenosti između njihovih središta. U tu svrhu promatrat ćemo bicentrični četverokut koji je ujedno i jednako-kračni trapez, što nam omogućava teorem 7. Bicentrični četverokut koji promatramo prikazan je na slici 3.

Tvrdnja 12. *Bicentrični četverokut, kojemu je R polumjer opisane kružnice, r polumjer upisane kružnice i d udaljenost između njihovih središta te kojemu je jedan vrh $A_1(r + d, \sqrt{-d^2 - 2dr - r^2 + R^2})$ ima površinu*

$$P = 2r \left(\sqrt{R^2 - (d - r)^2} + \sqrt{R^2 - (d + r)^2} \right). \quad (10)$$

Dokaz. Cijeli dokaz ove tvrdnje ovdje nećemo iznositi jer se on provodi analogno kao dokaz tvrdnje 11., već dajemo samo osnovne smjernice.

Primijetimo kako jednadžbe tangenti t_1 i t_3 nije potrebno računati rješavanjem sustava (5) jer su one okomite na x os, stoga iznose $t_1 \dots x = r + d$ i $t_3 \dots x = d - r$. Nakon što odredimo koordinate svih vrhova, kao



Slika 3. Na slici je prikazan (jednakokračni trapez) bicentrični četverokut s minimalnom površinom.

presjek tangenti i kružnice k_1 ,

$$\begin{aligned} x_2 &= x_3 = d - r \\ y_2 &= -y_3 = \sqrt{-d^2 + 2dr - r^2 + R^2} \\ x_4 &= x_1 = r + d \\ y_4 &= -y_1 = -\sqrt{-d^2 - 2dr - r^2 + R^2} \end{aligned}$$

površinu četverokuta računamo po formuli

$$P = \frac{1}{2} ((x_1 - x_2)(y_1 - y_2) + (x_2 - x_3)(y_2 - y_3) + (x_3 - x_4)(y_3 - y_4) + (x_4 - x_1)(y_4 - y_1)). \tag{11}$$

□

Komentar: Izraz (10) vrijedi samo za onaj bicentrični četverokut koji je ujedno i simetrični trapez, dok za sve ostale bicentrične četverokute možemo jedino tvrditi, prema teoremu 7., da je

$$P > 2r \left(\sqrt{R^2 - (d - r)^2} + \sqrt{R^2 - (d + r)^2} \right).$$

2.3. Primjer

Ako su poznati parametri R , d i koordinate jednog vrha tada točnu površinu bicentričnog četverokta, nakon što odredimo koordinate presotala tri vrha, možemo izračunati pomoću relacije (11). Algoritam za numerički račun točne površine svakog bicentričnog četverokuta donosimo u sljedećem primjeru.

Primjer 1. *Izračunajmo površinu bicentričnog četverokuta kojemu je jedan vrh u točki $A_1(\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$, opisana kružnica je polumjera $R = 1$ sa središtem u ishodištu koordinatnog sustava i udaljenost između središta upisane i opisane kružnice jednaka je $d = \frac{1}{3}$.*

Rješenje ovog primjera dajemo kroz račun koji je proveden u programskom paketu Wolfram Mathematica.

$$\text{In}[1]:= \text{fuss4}=\text{Expand}[(R^2 - d^2)^2 - 2r^2(R^2 + d^2)];$$

$$\text{In}[2]:= \text{r2}:=\frac{(d^2 - R^2)^2}{2(d^2 + R^2)};$$

$$\begin{aligned} \text{In}[3]:= \text{mali}=10^{-11}; \\ \{R, r, d\}=\left\{1, \sqrt{\frac{(d^2 - R^2)^2}{2(d^2 + R^2)}}, \frac{R}{3}\right\} \\ \text{A1t}=\{x1, y1\}=\left\{\frac{8R}{10}, \sqrt{R^2 - x1^2}\right\} \end{aligned}$$

$$\text{Out}[4]= \left\{1, \frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{1}{3}\right\}$$

$$\text{Out}[5]= \left\{\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right\}$$

Određujemo jednadžbu tangente na unutarnju kružnicu k_2 .

$$\begin{aligned} \text{In}[6]:= \text{eqta}[x_-, y_-]:=p x + q == y; \\ \text{eqt}[r_-, d_-]:=r^2(1 + p^2) - (p d + q)^2 == 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{In}[8]:= \text{rj}=\text{Solve}[\{\text{eqta}[x, y], \text{eqt}[r, d]\}, \{p, q\}]; \\ \text{pq}=\{p, q\}/.\text{rj}; \\ \text{rjt1}=\text{pq}[[1]]; \\ \text{rjt4}=\text{pq}[[2]]; \end{aligned}$$

```

In[12]:= pq12=rjt1//. {x -> x1, y -> y1, r^2 -> (d^2-R^2)^2/
r^4 -> (d^2-R^2)^4/(2(d^2+R^2))^2};
Assuming[{r > 0, d > 0, R > r + d}, FullSimplify[pq12]];
pq14=rjt4//. {x -> x1, y -> y1, r^2 -> (d^2-R^2)^2/
r^4 -> ((d^2-R^2)^2/(2(d^2+R^2)^2))};
FullSimplify[pq14];
N[{pq12, pq14}]

Out[16]= {{-4.07244, 3.85795}, {0.00792107, 0.593663}}

In[17]:= eqt1[x_, y_]:=pq12[[1]] x+pq12[[2]] ==y;
eqt4[x_, y_]:=pq14[[1]] x + pq14[[2]] ==y;

In[19]:= N[{ eqt1[x, y], eqt4[x, y] }]

Out[19]={3.85795 - 4.07244x == y, 0.593663 + 0.00792107x == y}

```

Određujemo presjek tangenti s vanjskom kružnicom k_1 .

```

In[20]:= kV[x_, y_]:=x^2 + y^2 == R^2;
rj = Solve[{eqt1[x, y], kV[x, y]}, {x, y}];
xy = Assuming[{r > 0, d > 0, R > r + d},
FullSimplify[{x, y} /. rj];
B1t = xy[[1]];
B2t = xy[[2]];
If[EuclideanDistance[B1t, A1t] < mali, A2t=B2t,
A2t=B1t];
"A1t, B1, B2, A2 ="
N[{A1t, B1t, B2t, A2t}]
rj = Solve[{eqt4[x, y], kV[x, y]}, {x, y}];
xy = Assuming[{r > 0, d > 0, R > r + d},
FullSimplify[{x, y} /. rj];
B1t = xy[[1]];
B2t = xy[[2]];
If[EuclideanDistance[B1t, A1t] < mali, A4t=B2t,
A4t=B1t];
"A1t, B1, B2, A4 ="
N[{A1t, B1t, B2t, A4t}]

```

Out[26]= "A1t, B1, B2, A2 ="

Out[27]= {{0.8, 0.6}, {0.8, 0.6}, {0.986919, -0.161216},
{0.986919, -0.161216}}

Out[33]= "A1t, B1, B2, A4 ="

Out[34]= {{0.8, 0.6}, {0.8, 0.6}, {-0.809404, 0.587252},
{-0.809404, 0.587252}}

Iz točke A_3 određujemo točku A_2 .

```
In[35]:=  rj = Solve[{eqt1[x, y], kV[x, y]}, {x, y}];
           pq23a=rjt1//.{x→A2t[[1]], y→A2t[[2]]};
           pq23b=rjt4//.x→A2t[[1]], y→A2t[[2]];
           If[EuclideanDistance[pq23a, pq12] < mali,
           pq23 = pq23b, pq23 = pq23a];
           "pq12 (t1) pq23a(t1 ii t2), pq23b (t1 ili t2), pq23 (t2) ="
           N[pq12, pq23a, pq23b, pq23]
           eqt2[x., y.]=pq23[[1]] x + pq23[[2]] == y;
           rj=Solve[{eqt2[x, y], kV[x, y]}, {x, y}];
           xy=Assuming[{r > 0, d > 0, R > r + d},
           FullSimplify[{x, y} /. rj];
           B1t=xy[[1]];
           B2t=xy[[2]];
           If[EuclideanDistance[B1t, A2t] < mali,
           A3t = B2t, A3t = B1t];
           "A2t, B1, B2, A3 ="
           N[{A2t, B1t, B2t, A3t}]
```

Out[39]= "pq12 (t1) pq23a(t1 ii t2), pq23b (t1 ili t2), pq23 (t2) ="

Out[40]= {{-4.07244, 3.85795}, {1.12995, -1.27639},
{-4.07244, 3.85795}, {1.12995, -1.27639}}

Out[47]= "A2t, B1, B2, A3 ="

Out[48]= {{0.986919, -0.161216}, {0.28, -0.96},
{0.986919, -0.161216}, {0.28, -0.96}}

```
In[49]:=  poly4gon={A1t, A2t, A3t, A4t, A1t};
           yt=xt=Table[0, {5}];
           {xt[[1]], yt[[1]]} = A1t;
           {xt[[2]], yt[[2]]} = A2t;
           {xt[[3]], yt[[3]]} = A3t;
           {xt[[4]], yt[[4]]} = A4t;
```

$$\{xt[[5]], yt[[5]]\} = A1t;$$

$$\text{In}[56]:= \text{Table}\{\{xt[[i]], yt[[i]]\}, \{i, 1, 5\}\} // \text{N}$$

$$\text{Out}[56]= \{\{0.8, 0.6\}, \{0.986919, -0.161216\}, \{0.28, -0.96\}, \{-0.809404, 0.587252\}, \{0.8, 0.6\}\}$$

Računamo površinu četverokuta kao sumu površina trokuta $\Delta A_1 A_2 A_3$ i $\Delta A_1 A_3 A_4$. Površine trokuta računamo po formuli (7).

$$\begin{aligned} \text{In}[57]:= & \text{P3a} = \text{Abs}[1/2 (A1t[[1]] (A2t[[2]]-A3t[[2]])+A2t[[1]] (A3t[[2]] \\ & -A1t[[2]])+A3t[[1]] (A1t[[2]]-A2t[[2]]))]; \\ & \text{P3b} = \text{Abs}[1/2 (A1t[[1]] (A3t[[2]] A4t[[2]])+A3t[[1]] (A4t[[2]] \\ & -A1t[[2]])+A4t[[1]] (A1t[[2]] - A3t[[2]]))]; \\ & \text{P1} = \text{N}[\text{P3a} + \text{P3b}] \end{aligned}$$

$$\text{Out}[59]= 1.59573$$

Računamo površinu relacijom (4).

$$\begin{aligned} \text{In}[60]:= & \text{a4}=A1A2=\text{Assuming}[R > d > 0, \\ & \text{Simplify}[\sqrt{(A1t[[1]] - A2t[[1]])^2 + (A1t[[2]] - A2t[[2]])^2}]; \\ & \text{b4}=A2A3=\text{Assuming}[\{r > 0, R > d > 0\}, \\ & \text{Simplify}[\sqrt{(A2t[[1]] - A3t[[1]])^2 + (A3t[[2]] - A2t[[2]])^2}]; \\ & \text{c4}=A3A4=\text{Assuming}[\{r > 0, R > d > 0\}, \\ & \text{Simplify}[\sqrt{(A4t[[1]] - A3t[[1]])^2 + (A4t[[2]] - A3t[[2]])^2}]; \\ & \text{d4}=A1A4=\text{Assuming}[R > d > 0, \\ & \text{Simplify}[\sqrt{(A1t[[1]] - A4t[[1]])^2 + (A1t[[2]] - A4t[[2]])^2}]; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{In}[64]:= & \text{P2}=\text{Assuming}[\{r > 0, R > d > 0\}, \\ & \text{FullSimplify}[\sqrt{\text{a4} \text{ b4} \text{ c4} \text{ d4}}]; \\ & \text{N}[\%] \end{aligned}$$

$$\text{Out}[65]= 1.59573$$

Računamo površinu relacijama (2) i (9) te provjeravamo da je $P1 = P2 < Pmax1 = Pmax2$.

$$\text{In}[66]:= \text{FullSimplify}[\text{P1}-\text{P2}];$$

$$\text{N}[\%]$$

$$\text{Out}[67]= \{ 0. \}$$

$$\text{In}[68]:= \text{Pmax1} = r \left(r + \sqrt{4R^2 + r^2} \right);$$

$$\text{N}[\%]$$

Out[69]= 1.6

In[70]:= Pmax2 = $\frac{4rR^2\sqrt{d^2 - r^2 - 2dR + R^2}}{(d - R)^2}$;
N[%]

Out[71]= 1.6

In[72]:= FullSimplify[Pmax1-Pmax2];
N[%]

Out[73]= { 0. }

Računamo minimalnu površinu relacijama (3) i (10) te provjeravamo da je $P1 = P2 > Pmin1 = Pmin2$.

In[74]:= Pmin1 = $2r\sqrt{2r(\sqrt{4R^2 + r^2} - r)}$;
N[%]

Out[75]= 1.59009

In[76]:= Pmin2 = $2r\left(\sqrt{R^2 - (d - r)^2} + \sqrt{R^2 - (d + r)^2}\right)$;
N[%]

Out[77]= 1.59009

In[78]:= FullSimplify[Pmin1-Pmin2];
N[%]

Out[79]= { 0. }

Komentar: Uvrštavanjem zadanih parametra $R = 1$ i $d = \frac{1}{3}$ u Fussyovu relaciju (1) izračunali smo polumjer upisane kružnice $r = \frac{4}{3\sqrt{5}}$.
Jednadžbe tangenti


$$y = 0.594 + 0.00794x \dots \text{ tangenta kroz vrhove } A_1 \text{ i } A_2,$$

$$y = -0.56234 - 1.420274x \dots \text{ tangenta kroz vrhove } A_2 \text{ i } A_3,$$

$$y = -1.2764 + 1.1299x \dots \text{ tangenta kroz vrhove } A_3 \text{ i } A_4,$$

$$y = 3.8579 - 4.0724x \dots \text{ tangenta kroz vrhove } A_4 \text{ i } A_1,$$

izračunali smo iz uvjeta da pravac $y = kx + l$ prolazi točkom (vrhom) i uvjeta da je taj pravac tangenata kružnice $k_2 \dots \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{16}{45}$. Preostale vrhove $A_2(-0.809404, 0.587252)$, $A_3(0.28, -0.96)$ i



Slika 4. Na slici je prikazan bicentrični četverokut iz primjera 1. (crvene boje), deltoid s najvećom površinom (zelene boje) i jednakokračni trapez s najmanjom površinom (plave boje).

$A_4(0.986919, -0.161216)$ izračunali smo kao presjek tangenti i vanjske kružnice $k_1 \dots x^2 + y^2 = 1$ (slika 4).

Površinu tako dobivenog četverokuta izračunali smo na dva načina, relacijama (7) i (4), te smo utvrdili da su dobivene vrijednosti jednake. S obzirom da dobiveni bicentrični četverokut nije deltoid (bicentrični četverokut s najvećom površinom kojeg možemo konstruirati unutar zadanih kružnica) niti jednakokračni trapez (bicentrični četverokut s najmanjom površinom kojeg možemo konstruirati unutar zadanih kružnica), u posljednjem koraku računa provjerili smo da vrijede relacije (2) i (9), odnosno relacije (3) i (10). I zaista, dobili smo da je površina zadanog bicentričnog četverokuta ($P_1 = 1.59573$) manja od površine deltoida ($P_{max} = 1.6$) te veća od površine jednakokračnog trapeza ($P_{min} = 1.59009$), koji se mogu konstruirati unutar tako zadanih kružnica.

3. Zaključak

U ovom radu izveli smo relaciju, u ovisnosti o parametrima R , r i d , za izračun površine najvećeg i najmanjeg bicentričnog četverokuta. U programskom paketu Wolfram Mathematica izveli smo navedenu relaciju, te smo kreirali algoritam za numerički izračun površine bilo kojeg bicentričnog četverokuta kojem je poznat jedan vrh te parametri R i d . Proverju svojih rezultata usporedili smo s već poznatim relacijama koje je izveo Josefsson.

Literatura

- [1] H. Dorrie, *100 Great Problems of Elementary Mathematics*, Dover, New York 1965.
- [2] M. Radić, A. Zatezalo, *About some kinds of bicentric polygons and concerning relations*, Math. Maced., Vol. 4 (2006), 47–73.
- [3] M. Radić *Certain relations between triangles and bicentric hexagonc*, Rad HAZU, Matematičke znanosti 503, 21–40 (2009) (in Croatian).
- [4] M. Orlić, Z. Kaliman, *Analytical Derivation of the Fuss Relations for Bicentric Hendecagon and Dodecagon*, Acta Phisica Polonica A, Vol. 128 (2015).
- [5] M. Orlić, Z. Kaliman, N. Orlić, *Using Mathematica in alternative derivation of Fuss relation for bicentric quadrilateral*, 6th International Conference APLIMAT 2007, Bratislava, 2007., 457–462.
- [6] M. Orlić, Z. Kaliman, *Mathematica in analytical derivation of Fuss' relation*, 6th International Conference APLIMAT 2007 Bratislava, 2007., 457–462.
- [7] M. Orlić, Z. Kaliman, *Problem tetivno-tangencijalnog četverokuta*, Matematičko fizički list, 238 (2009), 2; 86–91.
- [8] M. Josefsson, *Maximal Area of a Bicentric Quadrilateral*, Forum Geometricorum, Volume 12 (2012) 237–241.
- [9] M. Josefsson, *Minimal area of a bicentric quadrilateral*, The Mathematical Gazette, 99(545), 237–242, 2015.
- [10] M. Josefsson, *Calculations Concerning the Tangent Lengths and Tangency Chords of a Tangential Quadrilateral*, Forum Geometricorum, Volume 10 (2010) 119–130.

Mandi Orlić Bachler

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci,
51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 5, Hrvatska,
Tehničko veleučilište u Zagrebu, Katedra za matematiku,
10000 Zagreb, Av. V. Holjevca 15, Hrvatska

E-mail adresa: `mandi.orlic@tvz.hr`

Zoran Kaliman

Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci,
51000 Rijeka, Ulica Radmile Matejčić 2, Hrvatska

E-mail adresa: `zoran.kaliman@gmail.com`